



北京博凌科尚生物科技有限公司  
Beijing BLKW Biotechnology Co., Ltd.  
Tel: 010-57158602/52872342/80773165 (Fax)  
[Http://www.blkwbio.com/](http://www.blkwbio.com/)  
E-mail: blkwbio@blkwbio.com

- ◆ 新型植物基因组DNA快速提取试剂盒
- ◆ 目录号 1415
- ◆ 使用手册
- ◆ 实验室使用，仅用于体外

## 新型植物基因组 DNA 快速提取试剂盒

目录号： 1415

目录编号	包装单位
141501	50次
141502	100次
141503	200次

## ◆ 适用范围:

适用于快速提取植物组织、细胞、真菌基因组DNA

◆ 试剂盒组成、储存、稳定性：

试剂盒组成	保存	50 次	100 次	200 次
RNase A(10mg/ml)	-20°C	250 $\mu$ l	500 $\mu$ l	1 ml
缓冲液 AP1	室温	25 ml	50 ml	100 ml
缓冲液 AP2	室温	10 ml	20 ml	40 ml
缓冲液 AP3/E	室温	15 ml <u>第一次使用前按说明加指定量乙醇</u>	25 ml <u>第一次使用前按说明加指定量乙醇</u>	50 ml <u>第一次使用前按说明加指定量乙醇</u>
漂洗液 WB	室温	15 ml <u>第一次使用前按说明加指定量乙醇</u>	25ml <u>第一次使用前按说明加指定量乙醇</u>	50ml <u>第一次使用前按说明加指定量乙醇</u>
洗脱缓冲液 EB	室温	15 ml	20 ml	40 ml
吸附柱 AC	室温	50 个	100 个	200 个
收集管 (2ml)	室温	50 个	100 个	200 个

本试剂盒在室温储存 12 个月不影响使用效果。

储存事项：

1. 裂解液 AP1、AP3/E 低温时可能出现析出和沉淀，可以在 65°C 水浴几分钟帮助重新溶解（AP3 加入乙醇前可加热，加入乙醇后不可加热），**恢复澄清透明后冷却到室温** 即可使用。
2. 避免试剂长时间暴露于空气中产生挥发、氧化、pH 值变化，各溶液使用后应及时盖紧盖子。

---

## ❖ 产品介绍：

该试剂盒采用 DNA 吸附柱和新型独特的溶液系统，适合于从含酚类、多糖类和酶抑制物的植物样品中快速简单地提取基因组 DNA。可在 30 分钟内完成一个或多个 100mg 新鲜或 20mg 干燥的植物样品 DNA 的纯化工作。提取过程不需要用到有毒的酚氯仿等有机物抽提，也不需要用到耗时的异丙醇或乙醇沉淀，并能快速高效地去除多糖类、酚类和酶抑制物等杂质，纯化的 DNA 可直接用于 PCR、酶切和杂交等实验。

新鲜或干燥的植物组织（细胞）磨碎后经裂解液裂解；蛋白质、多糖、细胞残片被沉淀去除；然后基因组 DNA 在高离序盐状态下选择性吸附于离心柱内硅基质膜，再通过一系列快速的漂洗—离心的步骤，进一步将多糖，多酚和细胞代谢物，蛋白等杂质去除， 最后低盐的洗脱缓冲液将纯净基因组 DNA 从硅基质膜上洗脱。

## ❖ 产品特点：

1. 离心吸附柱内硅基质膜全部采用进口特制吸附膜，柱与柱之间吸附量差异极小，可重复性好。克服了国产试剂盒膜质量不稳定的弊端。
2. 不需要使用有毒的苯酚等试剂，也不需要乙醇沉淀等步骤。
3. 快速，简捷，单个样品操作一般可在 1 小时内完成。
4. 数种去多糖、多酚成份和多次柱漂洗确保高纯度，OD260/OD280 典型的比值达 1.7~1.9，可直接用于 PCR，Southern-blot 和各种酶切反应。

---

❖ 注意事项：

1. 所有的离心步骤均在室温完成，使用转速可以达到13,000 rpm的传统台式离心机，如Eppendorf 5415C 或者类似离心机。
2. 开始实验前将需要的水浴先预热到 65℃ 备用。
3. 缓冲液 AP3/E 中含有刺激性化合物，操作时要戴乳胶手套，**避免沾染皮肤，眼睛和衣服。若沾染皮肤、眼睛时，要用大量清水或者生理盐水冲洗。**
4. 不同来源的植物组织材料中提取DNA 的量会有差异，一般100mg新鲜组织典型产量可达3-25μg。
5. **洗脱液 EB 不含有螯合剂 EDTA， 不影响下游酶切、连接等反应。也可以使用水洗脱， 但应该确保 pH 大于 7.5， pH 过低影响洗脱效率。用水洗脱 DNA 应该保存在 -20°C。DNA 如果需要长期保存，可以用 TE 缓冲液洗脱（10mM Tris-HCl, 1mM EDTA, pH 8.0），但是 EDTA 可能影响下游酶切反应，使用时可以适当稀释。**

---

❖ 操作步骤：（实验前请先阅读注意事项）

提示：

- ⇒ 第一次使用前请先在漂洗液 WB 中加入指定量无水乙醇，充分混匀，加入后请及时在方框打钩标记已加入乙醇，以免多次加入！
- ⇒ 第一次使用前请先在缓冲液 AP3/E 中加入指定量无水乙醇！

1. 取适量植物组织（新鲜组织 100 mg 或干重组织 20 mg）在研钵中加入液氮充分碾磨成细粉。
2. 转移细粉到一个 1.5ml 离心管，不要解冻，加入 400 $\mu$ l 缓冲液 AP1 和 4 $\mu$ l RNase A(10 mg/ml)，旋涡振荡，充分混匀帮助裂解。

如果组织裂解困难，可根据需要加一个轻柔匀浆 10 秒的步骤帮助裂解。大多数情况下不需要离心去除未完全裂解的组织，因为后面有一个离心去除的步骤。

可选：多糖含量特别高的时候可以在 AP1 加入 2%PVP40, 000；多酚含量特别高的时候可以在 AP1 中加入 0.2% beta 疏基乙醇。也可两者同时加入。

3. 65°C水浴 10 分钟，在水浴过程中颠倒离心管 2-3 次，混合样品。
4. 加入 130  $\mu$ l 缓冲液 AP2，充分混匀，冰上放置 5 分钟，14,000 rpm 离心 5-10 分钟，小心吸取上清到一个新的 1.5ml 离心管，注意不要吸到界面物质。
5. 计算上清量，加入 1.5 倍体积的 AP3/E（请先检查是否已加入无水乙醇！），立即吹打混匀。

加入 AP3/E 可能会出现絮状沉淀，但不影响 DNA 提取。注意将 AP3/E 直接加入到上清并立即吹打混匀。

6. 将上一步所得混合物（包括可能出现的沉淀）加入一个吸附柱 AC 中，（吸附柱放入收集管中）13,000 rpm 离心 30-60 秒，倒掉收集管中的废液（先加 650 $\mu$ l 离心，弃废液，再加入剩余的溶液，再次离心）。

- 
7. 加入 700 $\mu$ l 漂洗液 WB (请先检查是否已加入无水乙醇!), 12,000 rpm 离心 30 秒, 弃掉废液。
8. 加入 500 $\mu$ l 漂洗液 WB, 12,000 rpm 离心 30 秒, 弃掉废液。
9. 将吸附柱 AC 放回空收集管中, 13,000 rpm 离心 2 分钟, 尽量除去漂洗液, 以免漂洗液中残留乙醇抑制下游反应。
10. 取出吸附柱 AC, 放入一个干净的离心管中, 在**吸附膜的中间部位**加 100 $\mu$ l 洗脱缓冲液 EB (洗脱缓冲液可事先在 65-70°C 水浴中预热), 室温放置 3-5 分钟, 12,000 rpm 离心 1 分钟。将得到的溶液重新加入吸附柱中, 室温放置 2 分钟, 12,000 rpm 离心 1 分钟。  
洗脱体积越大, 洗脱效率越高, 如果预计和需要产量高, 可增大洗脱体积, 如果需要 DNA 浓度较高, 可以适当减少洗脱体积, 但是最小体积不应少于 50 $\mu$ l, 体积过小降低 DNA 洗脱效率, 减少 DNA 产量。
11. DNA 可以存放在 2-8°C, 如果要长时间存放, 可以放置在 -20°C。

## ❖ 问题与解决方法

问题	评论与建议
DNA 产量低	*处理材料过量或者裂解不完全- <b>建议：</b> 使用适量的起始材料，充分研磨或者匀浆 *结合条件不恰当- <b>建议：</b> 步骤 5 精确估计上清量，加入 1.5 倍体积 AP3/E 量要准确
RNA 残留	*植物 RNA 含量太丰富- <b>建议：</b> 提高 RNase A 处理浓度
未提取到 DNA	*漂洗液 WB 中忘记加无水乙醇- <b>建议：</b> 第一次实验时，在漂洗液 WB 中加入指定量无水乙醇。
离心柱堵塞	*研磨裂解不充分，团块多；裂解物太粘稠；离心力太小- <b>建议：</b> 参见步骤 2，加一个离心步骤去除；减低起始材料量，不要处理过量，加大离心力
洗脱下来的 DNA 溶液带颜色或者膜上有明显的色素残留	*漂洗次数不够- <b>建议：</b> 步骤 8 完成后，加 500μl 乙醇再漂洗一遍 *起始材料太多过量- <b>建议：</b> 减少起始处理材料，不要过量
洗脱下来的 DNA 产量低	*离心柱残留有较多乙醇或者底部不慎沾有乙醇- <b>建议：</b> 确保做了步骤 9，否则残留乙醇会影响洗脱效率。 *使用了水或者其它非最佳液体代替洗脱缓冲液- <b>建议：</b> 仔细阅读步骤 10 和注意事项 5 和只使用洗脱缓冲液 EB 洗脱。 *洗脱缓冲液量偏低- <b>建议：</b> 使用 200μl 洗脱缓冲液洗脱
A <sub>260</sub> 吸光值异常偏高	*一些硅基质膜成分一起洗脱下来，干扰了吸光值- <b>建议：</b> 将洗脱的基因组 DNA 溶液 13,000rpm 再离心一分钟，小心取上清使用。
DNA 下游酶切不能切开或者酶切不完全	*一些硅基质膜成分一起洗脱下来，抑制了酶切反应- <b>建议：</b> 将洗脱的基因组 DNA 溶液 13,000rpm 再离心一分钟，小心取上清使用。 *离心柱残留有较多乙醇或者底部不慎沾有乙醇抑制了酶切反应- <b>建议：</b> 确保做了步骤 9，然后空气中晾几分钟，让残留乙醇挥发。